オイラックスＨクリームの報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

弊社承継後に報告を受けたオイラックスＨクリームの副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

承継日：2018 年６月１日

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2018 年	男性	72 歳	肛門周囲炎、高血圧、高脂血症、花粉症、アレルギー性結膜炎、痔	オイラックスＨクリーム	塗布部位（肛門周囲）の皮膚潰瘍	デキサメタゾン吉草酸エステル	軽快
2018 年	女性	44 歳	陰部の痒み、喘息	オイラックスＨクリーム	塗布部位（陰部）の熱感・刺激感	なし	不明
2019 年	女性	70 歳	皮膚炎、骨折	オイラックスＨクリーム	皮膚炎の悪化（赤み、痒み）	フェルビナク（添加物としてクロタミトンを含有）	回復
2022 年	男性	84 歳	右下腿の湿疹、高血圧、脂質異常症、慢性胃炎、脂肪肝、心筋梗塞、大腸憩室炎	オイラックスＨクリーム	アレルギー性接触皮膚炎	なし	回復
2022 年	女性	26 歳	右腕の痒み、切迫早産	オイラックスＨクリーム	接触性皮膚炎	なし	軽快

以上