本資料には、承認を受けた用法・用量とは異なる情報が含まれています。本資料は参考資料であり、下記薬剤との配合後の品質を保証するものではありません。

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

（日本薬局方　エダラボン注射液）

日新製薬株式会社

1．pH 変動試験

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」（20mL）に 0.1mol/L 塩酸試液あるいは 0.1mol/L 水酸化ナトリウム試液を各々10mL ずつ加え、pH 変動試験を行った。

保存条件：室温、室内散乱光下

測定項目：性状、pH（移動指数：添加前 pH と添加後 pH の差の絶対値）、含量（エダラボン残存率）

測定時間：添加直後、24 時間後（含量のみ）

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　　20mL 中：エダラボン 30mg 含有

性状：無色澄明の液

ｐＨ：3.8～4.5

含量：95.0～105.0%

0.1mol/L 塩酸試液 10mL 添加



経過時間	性状（外観変化所見）	移動指数	含量	残存率
添加直後	無色澄明の液（変化なし）	2.45	101.4 %	100.0 %
24 時間後	—	—	101.7 %	100.3 %

0.1mol/L 水酸化ナトリウム試液 10mL 添加



経過時間	性状（外観変化所見）	移動指数	含量	残存率
添加直後	無色澄明の液（変化なし）	7.51	102.6 %	100.0 %
24 時間後	—	—	101.9 %	99.3 %

0.1mol/L 塩酸試液 10mL あるいは 0.1mol/L 水酸化ナトリウム試液 10mL のどちらを添加した場合も、外観上の変化は認められなかった。また、含量についても添加直後から 24 時間後まで変化を認めず、安定であることが確認された。

2．配合変化試験

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」に配合薬剤（必要に応じ溶解液で溶解）を加え、配合変化試験を行った。

保存条件：室温、室内散乱光下（500～600lx）

測定項目：外観、pH、含量（エダラボン残存率）

測定時間：配合直後、0.5 時間後、1 時間後（外観、pH のみ）、3 時間後、6 時間後、24 時間後

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
全身麻酔剤	ラボナール注射用 0.3g （チオペンタール ナトリウム） ニプロ ES ファーマ	20mL	外観	白色結晶 析出	—	—	—	—	—
		20mL	ｐＨ	9.06	—	—	—	—	—
		—	含量	—	—	—	—	—	—
催眠鎮静剤、抗不安剤	ホリゾン注射液 10mg （ジアゼパム） 丸石製薬	20mL	外観	微黄白濁	—	—	—	—	—
		2mL	ｐＨ	4.79	—	—	—	—	—
		—	含量	—	—	—	—	—	—
抗てんかん剤	アレビアチン注 250mg （フェニトインナトリウム） 大日本住友製薬	20mL	外観	白濁	—	—	—	—	—
		5mL	ｐＨ	9.98	—	—	—	—	—
		—	含量	—	—	—	—	—	—
強心剤	イノバン注 200mg （ドパミン塩酸塩） 協和発酵キリン	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		10mL	ｐＨ	4.28	4.31	4.31	4.29	4.33	4.26
		—	含量	100.0 ％	102.6 ％	—	102.4 ％	101.7 ％	102.3 ％
	カタボン Hi 注 600mg （ドパミン塩酸塩） 武田テバ薬品	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		200mL	ｐＨ	4.21	4.22	4.22	4.22	4.17	3.88
		—	含量	100.0 ％	99.6 ％	—	99.6 ％	99.8 ％	99.0 ％
利尿剤	ソルダクトン静注用 200mg （カンレノ酸カリウム） ファイザー	20mL	外観	白濁	—	—	—	—	—
		20mL	ｐＨ	6.97	—	—	—	—	—
		—	含量	—	—	—	—	—	—
	ラシックス注 20mg （フロセミド） サノフィ	20mL	外観	白色沈殿 物析出	—	—	—	—	—
		2mL	ｐＨ	4.37	—	—	—	—	—
		—	含量	—	—	—	—	—	—

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
血圧降下剤	ペルジピン注射液 10mg （ニカルジピン塩酸塩） LTL ファーマ	20mL	外観	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明
		10mL	ｐＨ	4.32	4.33	4.32	4.31	4.35	4.28
		—	含量	100.0 ％	100.3 ％	—	100.2 ％	100.1 ％	99.8 ％
	ペルジピン注射液 25mg （ニカルジピン塩酸塩） LTL ファーマ	20mL	外観	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明
		25mL	ｐＨ	4.24	4.25	4.29	4.34	4.30	4.24
		—	含量	100.0 ％	100.6 ％	—	100.5 ％	100.6 ％	100.7 ％
血管拡張剤	ハンプ注射用 1000 （カルペリチド （遺伝子組換え）） 第一三共 溶解液：注射用水	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1Ｖ	ｐＨ	4.32	4.32	4.33	4.37	4.38	4.35
		10mL	含量	100.0 ％	99.9 ％	—	100.0 ％	100.3 ％	100.3 ％
	ヘルベッサー注射用 10 （ジルチアゼム塩酸塩） 田辺三菱製薬 溶解液：生理食塩液	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		2Ｖ	ｐＨ	4.28	4.32	4.30	4.32	4.31	4.25
		20mL	含量	100.0 ％	100.0 ％	—	99.8 ％	100.4 ％	100.3 ％
	ヘルベッサー注射用 250 （ジルチアゼム塩酸塩） 田辺三菱製薬 溶解液：注射用水	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1Ｖ	ｐＨ	4.24	4.27	4.27	4.30	4.28	4.25
		5mL	含量	100.0 ％	100.2 ％	—	100.1 ％	99.5 ％	100.2 ％
その他の循環器官用薬	グリセオール注 （濃グリセリン・果糖） 太陽ファルマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	極微赤色澄明	極微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	4.13	4.12	4.12	4.10	4.09	4.06
		—	含量	100.0 ％	100.5 ％	—	98.2 ％	95.1 ％	78.7 ％
	ニコリン注射液 500mg （シチコリン） 武田テバ薬品	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		10mL	ｐＨ	5.15	5.18	5.20	5.20	5.18	5.17
		—	含量	100.0 ％	99.7 ％	—	99.5 ％	98.3 ％	99.9 ％
	ニコリンＨ注射液 1g （シチコリン） 武田テバ薬品	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		4mL	ｐＨ	5.36	5.38	5.40	5.39	5.36	5.35
		—	含量	100.0 ％	100.8 ％	—	100.4 ％	101.8 ％	99.8 ％

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
その他の循環器官用薬	ノバスタン HI 注 10mg/2mL （アルガトロバン水和物） 田辺三菱製薬	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		2mL	ｐＨ	4.29	4.31	4.32	4.30	4.36	4.30
		—	含量	100.0 ％	100.1 ％	—	99.7 ％	100.0 ％	99.2 ％
	20%マンニットール注射液「YD」 （D-マンニトール） 陽進堂	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.47	4.61	4.65	4.57	4.60	4.64
		—	含量	100.0 ％	99.8 ％	—	99.7 ％	99.4 ％	98.8 ％
消化性潰瘍用剤	オメプラール注用 20 （オメプラゾールナトリウム） アストラゼネカ 溶解液：生理食塩液	20mL	外観	無色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明
		1Ｖ	ｐＨ	4.62	4.72	4.75	4.73	4.71	4.58
		20mL	含量	100.0 ％	99.7 ％	—	99.9 ％	98.3 ％	100.3 ％
	ガスター注射液 20mg （ファモチジン） LTL ファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		2mL	ｐＨ	4.64	4.63	4.64	4.64	4.64	4.66
		—	含量	100.0 ％	99.6 ％	—	99.7 ％	99.9 ％	100.1 ％
	ソルコセリル注 4mL （幼牛血液抽出物） 東菱薬品工業	20mL	外観	淡褐色澄明	淡褐色澄明	淡褐色澄明	淡褐色澄明	淡褐色澄明	淡褐色澄明
		4mL	ｐＨ	4.79	4.77	4.78	4.76	4.71	4.43
		—	含量	100.0 ％	102.8 ％	—	101.9 ％	101.2 ％	101.0 ％
	タガメット注射液 200mg （シメチジン） 大日本住友製薬	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		2mL	ｐＨ	4.46	4.46	4.46	4.45	4.46	4.48
		—	含量	100.0 ％	102.5 ％	—	101.8 ％	100.8 ％	101.6 ％
	タケプロン静注用 30mg （ランソプラゾール） 武田テバ薬品 溶解液：注射用水	20mL	外観	白濁	微黄色澄明 赤色沈殿析出	—	—	—	—
		1Ｖ	ｐＨ	5.07	5.18	—	—	—	—
		5mL	含量	—	—	—	—	—	—
副腎ホルモン剤	水溶性プレドニン 20mg （プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム） 塩野義製薬	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		5mL	ｐＨ	4.48	4.51	4.48	4.49	4.40	4.25
		—	含量	100.0 ％	100.5 ％	—	99.7 ％	101.1 ％	100.6 ％

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
副腎ホルモン剤	デカドロン注射液 1.65mg （デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム） アスペンジャパン	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1mL	ｐＨ	4.57	4.58	4.55	4.60	4.58	4.49
		—	含量	100.0 %	100.0 %	—	100.0 %	100.6 %	100.2 %
	リンデロン注 4mg(0.4%) （ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム） シオノギファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1mL	ｐＨ	4.55	4.55	4.54	4.51	4.48	4.24
		—	含量	100.0 %	99.4 %	—	99.5 %	99.5 %	99.5 %
混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合剤を除く。）	ビタメジン静注用 （ﾁｱﾐﾝﾓﾉﾎｽﾌｪｲﾄﾄｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ・B_6・B_{12}配合剤） 第一三共 溶解液：生理食塩液	20mL	外観	淡赤色澄明	淡赤色澄明	淡赤色澄明	淡赤色澄明	淡赤色澄明	淡赤色澄明
		1V	ｐＨ	4.52	4.60	4.65	4.69	4.67	4.62
		20mL	含量	100.0 %	99.9 %	—	98.4 %	97.2 %	90.9 %
糖類剤	大塚糖液 5% （精製ブドウ糖） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		100mL	ｐＨ	4.46	4.44	4.46	4.47	4.46	4.42
		—	含量	100.0 %	99.6 %	—	99.4 %	99.2 %	97.8 %
	大塚糖液 5% （精製ブドウ糖） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.54	4.47	4.56	4.55	4.50	4.51
		—	含量	100.0 %	99.6 %	—	99.0 %	97.8 %	94.8 %
	大塚糖液 50% （精製ブドウ糖） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	2.82	2.81	2.80	2.83	2.82	2.80
		—	含量	100.0 %	99.9 %	—	98.7 %	98.5 %	93.3 %
	ハイカリック液-1 号 （高カロリー輸液用基本液(5-1)） テルモ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		700mL	ｐＨ	4.45	4.45	4.46	4.45	4.44	4.48
		—	含量	100.0 %	99.2 %	—	98.8 %	97.4 %	91.6 %
	ハイカリック液-2 号 （高カロリー輸液用基本液(5-2)） テルモ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		700mL	ｐＨ	4.43	4.44	4.45	4.44	4.42	4.45
		—	含量	100.0 %	99.6 %	—	98.3 %	95.9 %	85.3 %
	マンニットール S 注射液 （D-ソルビトール・D-マンニトール） 陽進堂	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.61	4.63	4.66	4.66	4.63	4.65
		—	含量	100.0 %	99.9 %	—	99.6 %	99.2 %	98.2 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
たん白アミノ酸製剤	アミパレン輸液 （高カロリー輸液用 総合アミノ酸製剤(4)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		200mL	ｐＨ	6.83	6.83	6.82	6.82	6.85	6.86
		—	含量	100.0 %	99.8 %	—	99.2 %	98.5 %	96.3 %
	ネオパレン 1 号輸液 （アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(2-1)） 大塚製薬工場	20mL	外観	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明
		1000mL	ｐＨ	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.57
		—	含量	100.0 %	97.0 %	—	82.8 %	63.1 %	6.2 %
	ビーフリード輸液 （アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(4)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	6.65	6.65	6.66	6.65	6.65	6.65
		—	含量	100.0 %	92.0 %	—	57.6 %	34.8 %	2.8 %
	フルカリック 1 号輸液 （アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(1-1)） テルモ	20mL	外観	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明
		903mL	ｐＨ	5.05	5.05	5.05	5.05	5.04	5.01
		—	含量	100.0 %	98.2 %	—	92.7 %	83.4 %	29.4 %
	フルカリック 2 号輸液 （アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(1-2)） テルモ	20mL	外観	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明
		1003mL	ｐＨ	5.28	5.28	5.27	5.26	5.25	5.23
		—	含量	100.0 %	96.8 %	—	86.3 %	73.0 %	20.0 %
	フルカリック 3 号輸液 （アミノ酸・糖・電解質・ ビタミン(1-3)） テルモ	20mL	外観	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明	黄色澄明
		1103mL	ｐＨ	5.46	5.46	5.45	5.43	5.42	5.39
		—	含量	100.0 %	94.9 %	—	78.2 %	60.8 %	10.3 %
血液代用剤	KN3 号輸液 （維持液(6)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.21	5.23	5.23	5.23	5.22	5.22
		—	含量	100.0 %	99.4 %	—	97.6 %	94.7 %	85.5 %
	アクチット輸液 （酢酸維持液(1)） 扶桑薬品工業	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	極微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
		—	含量	100.0 %	98.8 %	—	95.2 %	90.1 %	74.9 %
	ヴィーンＤ輸液 （酢酸リンゲル液 （ブドウ糖加）） 扶桑薬品工業	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	極微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.37
		—	含量	100.0 %	98.3 %	—	94.2 %	90.7 %	78.1 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
血液代用剤	ヴィーンF 輸液 (酢酸リンゲル液) 扶桑薬品工業	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	6.10	6.10	6.10	6.09	6.10	6.09
		—	含量	100.0 %	99.3 %	—	99.8 %	99.7 %	99.3 %
	大塚生食注 (生理食塩液) 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		100mL	ｐＨ	4.30	4.30	4.29	4.30	4.30	4.25
		—	含量	100.0 %	99.9 %	—	100.0 %	99.5 %	99.3 %
	大塚生食注 (生理食塩液) 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.44	4.44	4.44	4.43	4.43	4.37
		—	含量	100.0 %	99.9 %	—	100.0 %	99.8 %	99.8 %
	クリニザルツ輸液 (維持液(キシリトール加)) 共和クリティケア	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.55	5.55	5.56	5.58	5.56	5.56
		—	含量	100.0 %	101.1 %	—	100.2 %	99.9 %	100.2 %
	サヴィオゾール輸液 (乳酸リンゲル液 (デキストラン 40 加)(2)) 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	6.35	6.37	6.39	6.39	6.38	6.33
		—	含量	100.0 %	99.6 %	—	97.3 %	95.9 %	90.6 %
	ソリタ-T1 号輸液 (開始液(1)) エイワイファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.20	5.22	5.22	5.23	5.21	5.20
		—	含量	100.0 %	99.8 %	—	98.4 %	97.2 %	90.7 %
	ソリタ-T2 号輸液 (脱水補給液(4)) エイワイファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.85	4.84	4.84	4.85	4.84	4.84
		—	含量	100.0 %	99.8 %	—	99.2 %	98.5 %	94.9 %
	ソリタ-T3 号輸液 (維持液(3)) エイワイファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	5.20	5.22	5.23	5.23	5.23	5.21
		—	含量	100.0 %	100.1 %	—	98.2 %	102.2 %	92.2 %
	ソルデム 3A 輸液 (維持液(3)) テルモ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.40	5.41	5.41	5.41	5.40	5.40
		—	含量	100.0 %	99.8 %	—	95.9 %	92.3 %	77.0 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
血液代用剤	低分子デキストランＬ注 （乳酸リンゲル液 （デキストラン 40 加）(1)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.15	5.16	5.15	5.15	5.13	5.13
		—	含量	100.0 %	99.7 %	—	98.1 %	96.8 %	92.3 %
	トリフリード輸液 （維持液(複合糖加)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	4.78	4.78	4.78	4.79	4.78	4.78
		—	含量	100.0 %	100.5 %	—	99.8 %	101.1 %	79.7 %
	フィジオゾール 3 号輸液 （維持液(9)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微赤色澄明	微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	4.57	4.57	4.58	4.57	4.59	4.58
		—	含量	100.0 %	99.4 %	—	98.0 %	96.1 %	87.0 %
	ヘスパンダー輸液 （ヒドロキシエチルデンプン配合剤） フレゼニウスカービジャパン	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	極微赤色澄明
		500mL	ｐＨ	5.26	5.25	5.25	5.25	5.25	5.26
		—	含量	100.0 %	100.0 %	—	95.5 %	93.4 %	85.2 %
	ポタコール R 輸液 （乳酸リンゲル液 （マルトース加）） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		250mL	ｐＨ	4.80	4.80	4.80	4.79	4.78	4.81
		—	含量	100.0 %	99.8 %	—	99.1 %	98.7 %	95.6 %
	ラクテック注 （乳酸リンゲル液） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.44	5.43	5.43	5.41	5.41	5.39
		—	含量	100.0 %	99.7 %	—	99.4 %	99.6 %	98.2 %
	ラクテック D 輸液 （乳酸リンゲル液 （ブドウ糖加）） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微黄色澄明
		500mL	ｐＨ	4.87	4.87	4.87	4.84	4.84	4.85
		—	含量	100.0 %	99.2 %	—	98.3 %	102.9 %	93.1 %
	ラクテック G 輸液 （乳酸リンゲル液 （ソルビトール加）） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	ｐＨ	5.39	5.41	5.41	5.42	5.41	5.39
		—	含量	100.0 %	95.4 %	—	98.5 %	99.9 %	103.2 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 （ヘパリンナトリウム） 持田製薬	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		10mL	ｐＨ	4.39	4.42	4.40	4.38	4.42	4.37
		—	含量	100.0 %	100.5 %	—	100.3 %	100.6 %	100.5 %
	ヘパリンナトリウム注 1万単位/10mL「AY」 （ヘパリンナトリウム） エイワイファーマ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		10mL	ｐＨ	4.38	4.40	4.39	4.41	4.40	4.36
		—	含量	100.0 %	100.1 %	—	100.5 %	100.9 %	100.5 %
	ヘパリンナトリウム注 1万単位/10mL「ニプロ」 （ヘパリンナトリウム） ニプロ	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		10mL	ｐＨ	4.38	4.38	4.36	4.35	4.36	4.24
		—	含量	100.0 %	100.1 %	—	100.3 %	100.4 %	100.6 %
酵素製剤	グルトパ注 2400 万 （アルテプラーゼ（遺伝子組換え）） 田辺三菱製薬 溶解液：注射用水	20mL	外観	白色浮遊物	白色浮遊物	白色浮遊物	白色浮遊物	白色浮遊物	白色浮遊物
		1Ｖ	ｐＨ	6.98	7.00	7.00	6.99	6.99	6.99
		40mL	含量	100.0 %	99.3 %	—	99.8 %	99.2 %	96.9 %
他に分類されない代謝性医薬品	オザグレル Na 点滴静注液 80mg「ケミファ」 （オザグレルナトリウム） 日本薬品工業	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微黄色澄明
		4mL	ｐＨ	5.79	5.79	5.78	5.64	5.64	5.51
		—	含量	100.0 %	100.0 %	—	99.0 %	98.8 %	94.1 %
	オザペンバッグ注 80mg （オザグレルナトリウム） 富士薬品	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		200mL	ｐＨ	5.61	5.61	5.61	5.59	5.57	5.44
		—	含量	100.0 %	99.9 %	—	101.1 %	100.8 %	100.0 %
	キサンボン注射用 20mg （オザグレルナトリウム） キッセイ薬品工業 溶解液：注射用水	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1Ｖ	ｐＨ	4.75	4.71	4.68	4.65	4.59	4.32
		2mL	含量	100.0 %	99.5 %	—	98.9 %	100.7 %	98.6 %
	注射用カタクロット 20mg （オザグレルナトリウム） 丸石製薬 溶解液：注射用水	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		1Ｖ	ｐＨ	4.73	4.70	4.66	4.65	4.59	4.31
		2mL	含量	100.0 %	99.3 %	—	100.0 %	100.5 %	99.0 %
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファメジンα点滴用キット 2g （セファゾリンナトリウム） LTL ファーマ 溶解液：生理食塩液	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明	微黄色澄明
		1 袋	ｐＨ	4.46	4.46	4.47	4.44	4.43	4.37
		100mL	含量	100.0 %	97.6 %	—	96.5 %	93.3 %	77.3 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤 溶解液	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ユナシン-S 静注用 1.5g （スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム） ファイザー 溶解液：生理食塩液	10mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微黄色澄明	黄色澄明
		1V	pH	7.64	7.64	7.61	7.63	7.59	7.52
		50mL	含量	100.0 %	98.8 %	—	89.3 %	75.0 %	33.2 %
	ユナシン-S 静注用 1.5g （スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム） ファイザー 溶解液：生理食塩液	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	微黄色澄明	黄色澄明
		1V	pH	7.64	7.65	7.63	7.67	7.63	7.59
		100mL	含量	100.0 %	98.3 %	—	93.2 %	85.2 %	50.2 %
合成抗菌剤	パズクロス点滴静注液 500mg （パズフロキサシンメシル酸塩） 田辺三菱製薬	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		100mL	pH	3.92	3.91	3.93	3.90	3.85	3.66
		—	含量	100.0 %	99.0 %	—	98.4 %	96.9 %	90.2 %
溶解剤	大塚蒸留水 （注射用水） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		500mL	pH	4.39	4.41	4.55	4.37	4.51	4.57
		—	含量	100.0 %	100.2 %	—	100.8 %	100.6 %	100.4 %

エダラボン点滴静注液 30mg「NS」　３剤配合による配合変化表

薬効分類	配合薬剤 薬剤名　（一般名） メーカー名	配合量 エダラボン 配合薬剤(上) 配合薬剤(下)	試験項目	経過時間 配合直後	0.5 時間後	1 時間後	3 時間後	6 時間後	24 時間後
糖類剤＋たん白アミノ酸製剤	ハイカリック液-1 号 （高カロリー輸液用基本液(5-1)） テルモ アミパレン輸液 （高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		700mL	pH	5.30	5.29	5.30	5.29	5.29	5.27
		300mL	含量	100.0 %	96.7 %	—	93.0 %	84.2 %	59.6 %
	ハイカリック液-2 号 （高カロリー輸液用基本液(5-2)） テルモ アミパレン輸液 （高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)） 大塚製薬工場	20mL	外観	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明	無色澄明
		700mL	pH	5.28	5.28	5.28	5.27	5.27	5.25
		300mL	含量	100.0 %	95.8 %	—	82.3 %	76.6 %	44.6 %

2019 年 7 月改訂