

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2012年6月

製造販売元  **日新製薬株式会社**
山形県天童市清池東二丁目3番1号

高血圧症・狭心症治療剤（持続性 Ca 拮抗剤）

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠

アムロジピン錠2.5mg「NS」

アムロジピン錠 5 mg「NS」

アムロジピンOD錠2.5mg「NS」

アムロジピンOD錠 5 mg「NS」

アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊製剤

劇薬、処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）

この度、標記製品の【使用上の注意】を下記のとおり改訂させていただきますのでご案内申し上げます。
なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われ
ますので、この点ご了承賜りますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

（下線部：追記）

改訂後	改訂前																		
<p>3. 相互作用 現行のとおり 併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">中略</td></tr><tr><td>シンバスタチン</td><td>シンバスタチン80mg (国内未承認の高用量)との併用により、 シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。</td><td>機序不明</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	中略			シンバスタチン	シンバスタチン80mg (国内未承認の高用量)との併用により、 シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。	機序不明	<p>3. 相互作用 省略 併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">中略</td></tr><tr><td>←追記</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	中略			←追記		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																	
中略																			
シンバスタチン	シンバスタチン80mg (国内未承認の高用量)との併用により、 シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。	機序不明																	
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																	
中略																			
←追記																			

2. 改訂理由

- ・自主改訂

- ・今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU）No.211に掲載される予定です。
- ・医薬品添付文書改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。
また、弊社ホームページ（<http://www.yg-nissin.co.jp/>）に最新添付文書が掲載されていますので、併せてご利用下さい。