

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2016年4月

製造販売元  **日新製薬株式会社**  
山形県天童市清池東二丁目3番1号

### 持続性選択H<sub>1</sub>受容体拮抗剤

日本薬局方  
エバスチン錠

**エバスチン錠 5 mg「NS」**  
**エバスチン錠 10 mg「NS」**

日本薬局方  
エバスチン口腔内崩壊錠

**エバスチンOD錠 5 mg「NS」**  
**エバスチンOD錠 10 mg「NS」**

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。  
なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われますので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

#### 1. 改訂内容 ( 部：読替え 部：削除)

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>1) ショック、<u>アナフィラキシー</u>：ショック、<u>アナフィラキシー</u>があらわれることがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫等の症状が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 以下、現行のとおり</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>1) ショック、<u>アナフィラキシー様症状</u>：ショック、<u>アナフィラキシー様症状</u>があらわれることがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、喉頭浮腫等の症状が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 以下、省略</p>

#### 2. 改訂理由

自主改訂