

## タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1mg「日新」・タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」の 報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社  
安全管理部

タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1mg「日新」・タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。  
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始：2010年11月

2022年4月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2011年	男性	78歳	前立腺肥大症による 排尿障害	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	尿漏れ	なし	回復
2011年	男性	74歳	不明	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	めまい	なし	回復
2016年	男性	79歳	前立腺肥大 低血圧 胃炎 尿酸結晶	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1mg「日新」	低血圧	なし	不明
2017年	男性	60歳代	不明	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	めまい	不明	回復
2019年	男性	79歳	前立腺肥大症 高血圧症 脂質異常症 高尿酸血症	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	頻尿	なし	不明
2020年	男性	80歳代	前立腺肥大症に伴う 排尿障害	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.1mg「日新」	焦点調節困難 ふらつき	なし	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2021年	男性	不明	頻尿	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	尿が出にくい	なし	不明
2021年	男性	不明	不明	タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「日新」	苦味	なし	不明

以上