


使用上の注意改訂のお知らせ

2014年11月

製造販売元  **日新製薬株式会社**
山形県天童市清池東二丁目3番1号

消化性潰瘍・胃炎治療剤

デュクアノン[®] 懸濁用配合顆粒
乾燥水酸化アルミニウムゲル
水酸化マグネシウム配合剤

デュクアノン[®] 配合内用液
水酸化アルミニウム・ゲル
水酸化マグネシウム配合剤

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。

なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 (___部 : 追記)

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
2. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること) 現行のとおり			2. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること) 省略		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
大量の牛乳 カルシウム製剤	現行のとおり	現行のとおり	大量の牛乳 カルシウム製剤	省略	省略
ドルテグラビル ナトリウム	ドルテグラビルの 血漿中濃度を C _{max} で72%、C ₂₄ で74% 低下させる。ドルテ グラビルナトリウ ムは本剤投与2時間 前又は6時間後の 投与が推奨される。	錯体を形成す ることにより、 ドルテグラビ ルの吸収が阻 害される。	← 追記		
他、現行のとおり			他、省略		

2. 改訂理由

- ・自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報 (DSU) No.235 に掲載される予定です。
最新の医薬品添付文書改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>) 又は弊社ホーム
ページ (<http://www.yg-nissin.co.jp/>) にてご確認下さい。