

ドネペジル塩酸塩錠「日新」

ドネペジル塩酸塩OD錠「日新」

服用される方及びご家族・介護者の方へ

ドネペジル塩酸塩錠「日新」



ドネペジル塩酸塩OD錠「日新」



- ◆PTPシートから取り出してから服用してください。
- ◆OD錠は服用する直前にPTPシートから取り出してください。
- ◆OD錠は水なしで服用できますが、その場合はかならず唾液で飲み込んでください。また、寝たままの状態では水なしで服用しないでください。

<必ず裏面もお読みください>

服用にあたっての注意

- ◆このお薬は、アルツハイマー型認知症の認知症症状の進行を遅らせるお薬です。医師、薬剤師の指示を守って、1日1回飲んでください。
- ◆3mg錠はからだをこのお薬に慣らすための量で、1～2週間服用します。その後、5mg錠を服用し、さらに症状の進行にあわせて10mg錠になります。
- ◆飲み忘れても、けっして2日分を一度に飲まないでください。誤って多く飲んでしまった場合は直ちに医師または薬剤師に連絡してください。
- ◆このお薬をご自身の判断で中止しないでください。急に服用を中止すると症状が悪化するおそれがあります。
- ◆飲む回数や量を間違わないように、お薬はできるだけご家族や介護者が管理してください。
- ◆子供の手の届かないところに保管してください。

このお薬の副作用について

- ◆眠気やめまい、意識障害などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ◆このお薬の主な副作用として、軽い吐き気、食欲が低下する、便が軟らかくなる、活発になりすぎる、イライラして落ち着かなくなることがあります。からだがお薬に慣れると、これらの症状は消えていくこともありますが、症状が続いたり、その他に気になる症状がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。



医療機関／薬局名