

# レビー小体型認知症用

## ドネペジル塩酸塩錠「日新」 ドネペジル塩酸塩OD錠「日新」を服用される 患者さん及びご家族、介護者の方へ

レビー小体型認知症でみられる認知機能障害の症状が進むのを遅らせ、  
認知機能の変動を少なくするお薬です。

### ドネペジル塩酸塩錠「日新」



### ドネペジル塩酸塩OD錠「日新」



このお薬を飲んで、普段と異なる以下のような症状が続く場合は、  
主治医または薬剤師に相談してください。

- 軽い吐き気、食欲不振、便が軟らかい
- パーキンソン症状（筋肉のこわばり、手足のふるえ、表情が乏しくなる、動作がゆっくりになる、小刻みで歩く、転倒しやすいなど）が悪化する

## 飲み方と気をつけていただきたいこと

- 主治医、薬剤師の指示を守って、**1日1回**飲んでください。
- お薬はPTPシートから取り出して飲んでください。
- OD錠は水なしで、舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液と一緒に飲むこともできます。寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- このお薬は3mg錠から開始し、1～2週間後に5mg錠になります。5mg錠で4週間以上経過後、10mg錠になります。

飲み始めの1～2週間

その後4週間以上

その後

1日1回3mg錠

----->

1日1回5mg錠

----->

1日1回10mg錠

- 飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分をできるだけ早く飲んでください。**決して2日分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は、直ちに主治医または薬剤師に相談してください。
- 主治医の指示なしに、ご自分の判断でお薬を飲むのをやめないでください。
- 飲む回数や量を間違わないように、お薬はできるだけご家族や介護者が管理してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。
- 意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先：