ファモチジン静注 10mg「日新」・ファモチジン静注 20mg「日新」の 報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社 安全管理部

ファモチジン静注 10mg「日新」・ファモチジン静注 20mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。 医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始:2011年6月

2024年2月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2011年	女性	34 歳	胃炎、筋骨格硬直、 季節性アレルギー	ファモチジン静注 20mg「日新」	アナフィラキシー反応	ファモチジン(錠剤)	回復
2013年	女性	38 歳	妊娠(帝王切開時の麻酔前投薬)、 喘息	ファモチジン静注 20mg「日新」	喘息発作	なし	回復
2014年	女性	70 歳	卵巣癌(上部消化管出血の抑制)、 喘息、高血圧	ファモチジン静注 20mg「日新」	アナフィラキシー	なし	軽快
2014年	女性	33 歳	妊娠(上部消化管出血の抑制)	ファモチジン静注 20mg「日新」	蕁麻疹、眼瞼浮腫、 咳、咽喉そう痒違和感	塩酸メトクロプラミド、 乳酸リンゲル液 (デキストラン 40 加)	回復
2015年	不明	不明	上部消化管出血	ファモチジン静注 20mg「日新」	発疹	不明	回復
2015年	男性	84 歳	下肢閉塞性動脈硬化症(侵襲ストレスによる上部消化管出血の抑制)、高尿酸血症、 慢性心房細動、気管支喘息、 膵炎	ファモチジン静注 20mg「日新」	血小板減少	なし	回復

情報入手	性別	年龄	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2016年	女性	24 歳	乳癌 (化学療法による過敏症予防)	ファモチジン静注 20mg「日新」	膨隆疹	なし	軽快
2016年	女性	85 歳	認知症、誤嚥性肺炎、糖尿病、 寝たきり	ファモチジン静注 20mg「日新」	発疹、顔面浮腫、 好酸球増加、顔面紅潮	なし	軽快
2018年	不明	不明	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	血管痛	不明	不明
2019年	女性	96 歳	ストレス性潰瘍、 十二指腸潰瘍穿孔	ファモチジン静注 20mg「日新」	劇症肝炎、 汎血球減少症	アセトアミノフェン	死亡
2020年	不明	高齢者	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	口腔内出血	【併用薬(被疑薬かは不明)】 高カロリー輸液用基本液、 チアミンジスルフィド・ B ₆ ・B ₁₂ 配合剤、 塩化マンガン・硫酸亜鉛 水和物配合剤	不明
2020年	不明	高齢者	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	口腔内出血	【併用薬(被疑薬かは不明)】 高カロリー輸液用基本液、 チアミンジスルフィド・ B ₆ ・B ₁₂ 配合剤、 塩化マンガン・硫酸亜鉛 水和物配合剤	不明
2020年	男性	46 歳	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	多形紅斑型薬疹、無顆粒球症	アセトアミノフェン、 フロセミド、 バンコマイシン塩酸塩、 セフトリアキソンナトリ ウム水和物、 レボフロキサシン水和物	不明
2021年	女性	71 歳	左後頭葉転移性脳腫瘍、 肺腺癌、高血圧、 左後頭部血管腫(術後投与)	ファモチジン静注「日新」 (規格不明)	薬疹	なし	回復
2023年	女性	72 歳	腹部膨満感増悪(膵神経内分泌 癌による)、多発肝転移	ファモチジン静注 20mg「日新」	白血球減少	なし	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2023年	男性	83 歳	嘔吐、慢性腎不全、貧血、便秘、 腎性貧血、心不全、高脂血症、 高尿酸血症、高カリウム血症、 高血圧	ファモチジン静注 20mg「日新」	肝機能値上昇、発赤、 全身の痒み	なし	軽快

以上