

## ファモチジン静注 10mg「日新」・ファモチジン静注 20mg「日新」の 報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社  
安全管理部

ファモチジン静注 10mg「日新」・ファモチジン静注 20mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。  
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始：2011年6月

2022年4月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2011年	女性	34歳	胃炎、筋骨格硬直、 季節性アレルギー	ファモチジン静注 20mg「日新」	アナフィラキシー反応	ファモチジン（錠剤）	回復
2013年	女性	38歳	妊娠（帝王切開時の麻酔前投薬）、 喘息	ファモチジン静注 20mg「日新」	喘息発作	なし	回復
2014年	女性	70歳	卵巣癌（上部消化管出血の抑制）、 喘息、高血圧	ファモチジン静注 20mg「日新」	アナフィラキシー	なし	軽快
2014年	女性	33歳	妊娠（上部消化管出血の抑制）	ファモチジン静注 20mg「日新」	蕁麻疹、眼瞼浮腫、 咳、咽喉そう痒違和感	塩酸メトクロプラミド、 乳酸リンゲル液 （デキストラン 40 加）	回復
2015年	不明	不明	上部消化管出血	ファモチジン静注 20mg「日新」	発疹	不明	回復
2015年	男性	84歳	下肢閉塞性動脈硬化症（侵襲ス トレスによる上部消化管出血 の抑制）、高尿酸血症、 慢性心房細動、気管支喘息、 膵炎	ファモチジン静注 20mg「日新」	血小板減少	なし	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2016年	女性	24歳	乳癌 (化学療法による過敏症予防)	ファモチジン静注 20mg「日新」	膨隆疹	なし	軽快
2016年	女性	85歳	認知症、誤嚥性肺炎、糖尿病、寝たきり	ファモチジン静注 20mg「日新」	発疹、顔面浮腫、好酸球増加、顔面紅潮	なし	軽快
2018年	不明	不明	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	血管痛	不明	不明
2019年	女性	96歳	ストレス性潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔	ファモチジン静注 20mg「日新」	劇症肝炎、汎血球減少症	アセトアミノフェン	死亡
2020年	不明	高齢者	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	口腔内出血	【併用薬(被疑薬かは不明)】 高カロリー輸液用基本液、 チアミンジスルフィド・ B <sub>6</sub> ・B <sub>12</sub> 配合剤、 塩化マンガン・硫酸亜鉛 水和物配合剤	不明
2020年	不明	高齢者	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	口腔内出血	【併用薬(被疑薬かは不明)】 高カロリー輸液用基本液、 チアミンジスルフィド・ B <sub>6</sub> ・B <sub>12</sub> 配合剤、 塩化マンガン・硫酸亜鉛 水和物配合剤	不明
2020年	男性	46歳	不明	ファモチジン静注 20mg「日新」	多形紅斑型薬疹、 無顆粒球症	アセトアミノフェン、 フロセミド、 バンコマイシン塩酸塩、 セフトリアキソンナトリ ウム水和物、 レボフロキサシン水和物	不明
2021年	女性	71歳	左後頭葉転移性脳腫瘍、 肺腺癌、高血圧、 左後頭部血管腫(術後投与)	ファモチジン静注「日新」 (規格不明)	薬疹	なし	回復

以上