

パロキセチン錠「日新」を 服用される患者様及びご家族の皆様へ

5mg



10mg



20mg



このお薬は、抑うつ気分や不安を和らげるお薬です。飲みはじめは、すぐに効果はあらわれませんが、飲み続けることで徐々に効いてきます。

お薬の効果を得るためには「飲み忘れをしないこと」、「自分の判断で急に飲む量を減らしたり、やめたりしないこと」が大切です。

このお薬を飲む前に

18歳未満の大うつ病性障害のある人がこのお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったとの報告や、死んでしまいたいという気持ちを強めるという報告があります。**18歳未満の大うつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。**

このお薬を飲むときに注意すること

- ◆**医師、薬剤師の指示を守って、1日1回夕食後に飲んでください。**
- ◆**毎日飲み続けることで徐々に効いてくるお薬です。すぐに効果があらわれないからといって、勝手に飲むのをやめてしまわないようにしましょう。**
- ◆**飲みはじめの頃は、人によって吐き気や胃もたれなどの症状があらわれることがあります。しばらく飲み続けるとこれらの症状は消えていくこともありますが、必ず医師に相談してください。**



<必ず裏面もお読みください>

- ◆**眠気、めまい**などの症状があらわれることがありますので、自動車の運転などの**危険を伴う機械の操作には十分に注意**してください。
- ◆他の医師を受診する場合や他のお薬を飲む場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。
- ◆このお薬を中止するときは、**数週間～数ヵ月かけて、少しずつ量を減らして**いきます。自分の判断で急に飲むのを中止してはいけません。**中止するときは必ず医師の指示に従って**ください。
- ◆飲むのを中止したり、量を減らした場合に、めまい、汗をかく、吐き気などの症状があらわれることがありますが、これらの症状の多くはしばらくすると治まります。症状の程度は、ほとんど軽いものですが、我慢できない症状があらわれた場合は、医師に相談してください。

もともとうつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと覚えることがあります。このお薬との関連性は明らかではありませんが、このお薬を飲んでいる間に、まれに不安感や死んでしまいたいと思う気持ちが強くなったり、ごくまれに攻撃的な態度や行動をとったりすることがあります。特に飲みはじめや飲む量を変更したときは注意し、このような症状があらわれた場合には、すぐに医師に相談してください。

ご家族の方へ

- ◆ご家族の方は、**患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともある病気の症状が悪化する危険性**について、医師から十分に理解できるまで説明を受け、医師と緊密に連絡を取り合うよう心がけてください。
- ◆患者さんの**状態の変化について注意深く見守り**、変化がみられた場合には医師に連絡してください。

医療機関／薬局名

