パロキセチン錠５mg「日新」・パロキセチン錠 10mg「日新」・パロキセチン錠 20mg「日新」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

パロキセチン錠５mg「日新」・パロキセチン錠 10mg「日新」・パロキセチン錠 20mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始：2012 年６月

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2015 年	女性	78 歳	脳梗塞 うつ症状 発熱	パロキセチン錠 10mg「日新」	肝機能検査値異常	アセトアミノフェン サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩配合剤	回復
2017 年	女性	83 歳	老人性うつ病 Th12 圧迫骨折 アルツハイマー型認知症 熱中症 胃潰瘍 肝機能障害	パロキセチン錠 10mg「日新」	低ナトリウム血症（SIADH の疑い）	なし	不明
2019 年	男性	52 歳	手のつっぱり・こわばり 脳梗塞 高血圧 高尿酸血症 高ホモシスチン血症	パロキセチン錠 10mg「日新」	霧視 視力低下	なし	軽快

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2021 年	女性	63 歳	うつ状態 高血圧症	パロキセチン錠 10mg「日新」	眠気 頭痛 めまい 吐き気	なし	回復

以上