

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2014年1月

製造販売元



日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

糖尿病食後過血糖改善剤  
日本薬局方 ボグリボース錠  
**ボグリボース錠0.2mg「NS」**  
**ボグリボース錠0.3mg「NS」**

処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）

（旧販売名：ベスタミオン錠0.2／ベスタミオン錠0.3）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。

なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われま  
すので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（\_\_部：改訂）

改訂後	改訂前
<b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (1)～(5) 現行のとおり (6) 本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。また、高所作業、自動車の運転等に従事している患者に投与するときには注意すること。（「重大な副作用」の項参照）	<b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (1)～(5) 省略 (6) 本剤の使用にあたっては、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。（「重大な副作用」の項参照）

### 2. 改訂理由

・厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発 0107 第1号（平成26年1月7日付）に基づく改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU）No.226に掲載される予定です。  
最新の医薬品添付文書改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）又は弊社ホームページ（<http://www.yg-nissin.co.jp/>）にてご確認ください。