

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 の報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社
安全管理部

ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」 の報告副作用につきましては下記の通りです。

医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 ハタナジン錠：1984年8月

⇒ハタナジン錠 25mg：2009年9月（販売名変更）

⇒ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」：2013年8月（販売名変更）

2021年12月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
1986年	不明	成人	不眠	ハタナジン錠	めまい ふらふら感	(アルコール)	不明
1987年	男性	50歳	蕁麻疹 高脂血症 胃切後胃炎	ハタナジン錠	発疹	不明	不明
1992年	不明	成人	不明	ハタナジン錠	口唇腫脹	不明	不明
2009年	女性	60歳代	皮膚疾患	ハタナジン錠	血圧低下 ふらつき	なし	不明
2021年	女性	40歳	(アレルギーの予防)	ヒドロキシジンパモ酸塩錠 25mg 「日新」	霧視 痒み 嘔吐 意識消失	【併用薬(被疑薬かは不明)】 デュロキセチン塩酸塩等	【霧視、痒み、嘔吐】 不明 【意識消失】 回復

以上