


# ピタバスタチンCa錠「日新」

を服用される患者様へ



このお薬は、肝臓でのコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

## このお薬を飲むときに注意すること

- ◆必ず主治医、薬剤師の指示を守って飲んでください。
- ◆飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、忘れた分を飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。決して2回分を一度に飲まないでください。誤って多く飲んだ場合は主治医または薬剤師に相談してください。
- ◆筋肉の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」\* が起こることが知られています。  
次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので、直ちに服用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。

- 筋肉が痛い ○手足の力が入らない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)
- 手足のこわばり、しびれ

<必ず裏面もお読みください>

## \*「横紋筋融解症」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

- 筋肉が痛い
- 手足の力が入らない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)
- 手足のこわばり
- 手足のしびれ



—すぐに主治医または薬剤師に連絡してください—

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。また、他にもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名