バルサルタン錠 20mg「日新」・バルサルタン錠 40mg「日新」・バルサルタン錠 80mg「日新」・バルサルタン錠 160mg「日新」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

バルサルタン錠 20mg「日新」・バルサルタン錠 40mg「日新」・バルサルタン錠 80mg「日新」・バルサルタン錠 160mg「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始：2014 年６月

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2017 年	女性	80 歳	高血圧症、 高コレステロール血症	バルサルタン錠 40mg「日新」	味覚異常	【併用薬(医師により被疑薬とされたか不明)】 アトルバスタチンカルシウム水和物	不明
2018 年	女性	76 歳	高血圧症	バルサルタン錠 40mg「日新」	腫れ、発疹（両足首）	なし	軽快
2019 年	女性	89 歳	慢性心不全、気管支喘息、糖尿病、脂質異常症	バルサルタン錠 40mg「日新」	薬剤性肝障害	なし	回復
2022 年	男性	68 歳	高血圧症、虚血性心疾患	バルサルタン錠 80mg「日新」	発疹（片腕）	なし	回復

以上