

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2014年6月

製造販売元  **日新製薬株式会社**  
山形県天童市清池東二丁目3番1号

選択的AT<sub>1</sub>受容体ブロッカー

日本薬局方 バルサルタン錠

**バルサルタン錠20mg「日新」**

**バルサルタン錠40mg「日新」**

**バルサルタン錠80mg「日新」**

**バルサルタン錠160mg「日新」**

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。

なお、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（ 部：薬食安通知による改訂）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
3. 相互作用			3. 相互作用		
併用注意（併用に注意すること）			併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレン	現行のとおり	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。	アリスキレン	省略	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。		← 追記		
(略)			(略)		

### 2. 改訂理由

- 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発 0603 第1号（平成26年6月3日付）に基づく改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU）No.230に掲載される予定です。  
最新の医薬品添付文書改訂情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）又は弊社ホームページ（<http://www.yg-nissin.co.jp/>）にてご確認ください。