

サリチル酸ナトリウム静注 0.5g 「日新」の報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社
安全管理部

サリチル酸ナトリウム静注 0.5g 「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 ネオザルベリン：1987年10月

⇒ネオザルベリン静注 0.5g：2008年12月（販売名変更）

⇒サリチル酸ナトリウム静注 0.5g 「日新」：2014年6月（販売名変更）

2024年2月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	軽帰
1994年	不明	成人	不明	ネオザルベリン	血管痛	なし	不明
2003年	男性	30歳	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気 嘔吐	ブドウ糖(20%)	回復
2003年	男性	63歳	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気 嘔吐	ブドウ糖(20%)	回復
2003年	不明	成人	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気 嘔吐	チアミン塩化物塩酸塩	不明
2003年	不明	成人	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気	チアミン塩化物塩酸塩	不明
2003年	不明	成人	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気	チアミン塩化物塩酸塩	不明
2003年	不明	成人	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気	チアミン塩化物塩酸塩	不明
2003年	不明	成人	症候性神経痛	ネオザルベリン	嘔気	チアミン塩化物塩酸塩	不明

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2004 年	男性	83 歳	歯痛 心筋梗塞 糖尿病 高尿酸血症 気管支喘息	ネオザルベリン	ショック	なし	死亡
2020 年	不明	不明	不明	サリチル酸ナトリウム静注 0.5g 「日新」	血管痛	不明	回復

以上