プロピベリン塩酸塩錠 10mg「NS」・プロピベリン塩酸塩錠 20mg「NS」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

プロピベリン塩酸塩錠 10mg「NS」・プロピベリン塩酸塩錠 20mg「NS」の報告副作用につきましては下記の通りです。
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始　バルレール錠 10：2005 年７月
⇒プロピベリン塩酸塩錠 10mg「NS」：2015 年１月（販売名変更）

バルレール錠 20：2005 年７月
⇒プロピベリン塩酸塩錠 20mg「NS」：2014 年 12 月（販売名変更）

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2016 年	女性	88 歳	頻尿（尿路感染症）、高血圧症、めまい、アルツハイマー型認知症、ビタミン B12・カリウム欠乏、便秘症	バルレール錠 10	アナフィラキシーショック	塩酸ロメフロキサシン	回復
2020 年	女性	77 歳	頻尿、高血圧症	プロピベリン塩酸塩錠 10mg「NS」	目のかすみ	なし	回復
2021 年	男性	86 歳	頻尿	プロピベリン塩酸塩錠 10mg「NS」	背中と足のかゆみ、湿疹、便秘、嘔吐	なし	回復
2022 年	不明	10 歳	夜尿症	プロピベリン塩酸塩錠「NS」（規格不明）	視力低下（片目）	不明	不明

以上