

強心剤

処方箋医薬品(注意-医師等の  
処方箋により使用すること)

日本薬局方 **アミノフィリン** 注射液

貯法: 遮光保存  
使用期限: 3年(外箱に記載)  
注意: 【取扱い上の注意】の項参照

J・P Aminophylline Injection

\*\* **アミノフィリン** 静注250mg「日新」

** 承認番号	22700AMX00064000
** 薬価収載	薬価基準未収載
** 販売開始	
再評価結果	1998年3月

**【禁忌(次の患者には投与しないこと)】**

本剤又は他のキサンチン系薬剤に対し重篤な副作用の既往歴のある患者

\*\*【組成・性状】

販売名	アミノフィリン静注250mg「日新」
容量	1管 10mL
有効成分・含量(1管中)	日本薬局方アミノフィリン水和物250mg
添加物(1管中)	エチレンジアミン15mg
性状	無色澄明の液で、味はわずかに苦い。光によって徐々に変化する。
pH	8.0~10.0
浸透圧比	約1(生理食塩液に対する比)

**【効能・効果】**

気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、肺性心、うっ血性心不全、肺水腫、心臓喘息、チェーン・ストークス呼吸、閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)における呼吸困難、狭心症(発作予防)、脳卒中発作急性期

**【用法・用量】**

アミノフィリン水和物として、通常成人1回250mgを1日1~2回生理食塩液又は糖液に希釈して5~10分を要して静脈内に緩徐に注入する。必要に応じて点滴静脈内注射する。

小児には1回3~4mg/kgを静脈内注射する。投与間隔は8時間以上とし、最高用量は1日12mg/kgを限度とする。必要に応じて点滴静脈内注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

**〈用法・用量に関連する使用上の注意〉**

本剤を小児の気管支喘息に投与する場合の投与量、投与方法等については、学会のガイドライン\*等、最新の情報を参考とすること。

\* ※日本小児アレルギー学会:小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012

1. アミノフィリン水和物投与量の目安

	年齢	テオフィリン等が経口投与されていない場合	テオフィリン等が既に経口投与されている場合
* 初期投与量	6ヵ月~2歳未満	3~4mg/kgを30分以上かけて点滴投与	3~4mg/kgを30分以上かけて点滴投与。なお、テオフィリン等が投与されている場合は、その製剤の種類、投与後の経過時間、投与量などを考慮して、適宜、減量する。
	2歳~15歳未満 <sup>注1)注2)</sup>	4~5mg/kgを30分以上かけて点滴投与	3~4mg/kgを30分以上かけて点滴投与

	年齢	投与量
* 維持投与量	6ヵ月~1歳未満	0.4mg/kg/時
	1歳~2歳未満	0.8mg/kg/時
	2歳~15歳未満 <sup>注2)</sup>	0.8mg/kg/時

注1) 初期投与量は、250mgを上限とする。

\* 注2) 肥満児の投与量は、標準体重で計算する。

2. 注意すべき投与対象等

2歳以上の大発作又は呼吸不全の患児を除き、他剤無効又は効果不十分な場合に、患児の状態(発熱、痙攣等)等を十分に観察するなど適用を慎重に検討し投与すること。なお、2歳未満の熱性痙攣やてんかんのけいれん性疾患のある児への投与は原則として推奨されない。

**【使用上の注意】**

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 急性心筋梗塞、重篤な心筋障害のある患者[心筋刺激作用を有するため症状を悪化させることがある。]
- てんかんの患者[中枢刺激作用によって発作を起こすことがある。]
- 甲状腺機能亢進症の患者[甲状腺機能亢進に伴う代謝亢進、カテコールアミンの作用を増強することがある。]
- 急性腎炎の患者[腎臓に対する負荷を高め、尿蛋白が増加するおそれがある。]
- 肝障害のある患者[テオフィリンクリアランスが低下し、テオフィリン血中濃度が上昇することがあるので、血中濃度測定等の結果により減量すること。]
- 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人、産婦、授乳婦(「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)
- 小児

1) 小児、特に乳幼児は成人に比べて痙攣を惹起しやすく、また、テオフィリンクリアランスが変動しやすいのでテオフィリン血中濃度のモニタリングを行うなど慎重に投与すること。なお、次の小児にはより慎重に投与すること。

- てんかん及び痙攣の既往歴のある小児[痙攣を誘発することがある。]
- 発熱している小児[テオフィリン血中濃度の上昇や痙攣等の症状があらわれることがある。]
- 6ヵ月未満の乳児[乳児期にはテオフィリンクリアランスが一定していない。6ヵ月未満の乳児ではテオフィリンクリアランスが低く、テオフィリン血中濃度が上昇することがある。]

2) 低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

2. 重要な基本的注意

- うっ血性心不全の患者に投与する場合は、テオフィリン血中濃度が上昇することがあるので注意して使用すること。
- テオフィリンによる副作用の発現は、テオフィリン血中濃度の上昇に起因する機会が多いことから、血中濃度のモニタリングを適切に行い、患者個人に適切な投与計画を設定することが望ましい。
- 副作用が発現した場合には減量又は投与を中止し、テオフィリン血中濃度を測定することが望ましい。

3. 相互作用

本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP1A2で代謝される。

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他のキサンチン系薬剤 テオフィリン コリンテオフィリン ジプロフィリン カフェイン水和物等 中枢神経興奮薬 エフェドリン塩酸塩 マオウ等	過度の中枢神経刺激作用があらわれることがある(「過量投与」の項参照)。副作用の発現に注意し、異常が認められた場合には減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	併用により中枢神経刺激作用が増強される。

薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
交感神経刺激剤 (β刺激剤) イソプレナリン塩 酸塩 クレンブテロール 塩酸塩 ツロブテロール塩 酸塩 テルブタリン硫酸 塩 プロカテロール塩 酸塩水和物等	低カリウム血症、 心・血管症状(頻脈、 不整脈等)等のβ刺 激剤の副作用症状を 増強させることがあ る。 副作用の発現に注意 し、異常が認められ た場合には減量又は 投与を中止するなど 適切な処置を行うこ と。	心刺激作用をとも に有しており、β刺 激剤の作用を増強す るためと考えられる。 低カリウム血症の増 強についての機序は 不明である。
ハロタン	不整脈等の副作用が 増強することがある。 また、連続併用によ りテオフィリン血中 濃度が上昇すること がある。 副作用の発現に注意 し、異常が認められ た場合には減量又は 投与を中止するなど 適切な処置を行うこ と。	テオフィリンとハロ タンの心臓に対する 作用の相加又は相乗 効果と考えられる。
ケタミン塩酸塩	痙攣があらわれるこ とがある。 痙攣の発現に注意し、 異常が認められた場 合には抗痙攣剤の投 与など適切な処置を 行うこと。	痙攣閾値が低下す るためと考えられる。
シメチジン メキシレチン塩酸塩 プロパフェノン塩酸 塩 アミオダロン塩酸塩 エノキサシン水和物 ビベミド酸水和物 塩酸シプロフロキサ シン ノフロキサシン トスフロキサシント シル酸塩水和物 バズフロキサシンメ シル酸塩 ブルリフロキサシン エリスロマイシン クラリスロマイシン ロキサシロマイシン チアベンダゾール チクロピジン塩酸塩 ベラパミル塩酸塩 ジルチアゼム塩酸塩 フルボキサミンマレ イン酸塩 フルコナゾール ジスルフィラム デフェラシロクス	テオフィリンの中毒 症状があらわれるこ とがある(「過量投 与」の項参照)。 副作用の発現に注意 し、異常が認められ た場合には減量又は 投与を中止するなど 適切な処置を行うこ と。	肝薬物代謝酵素が阻 害され、テオフィリ ンクリアランスが低 下するため、テオ フィリン血中濃度が 上昇すると考えられ る。
アシクロビル パラシクロビル塩酸塩 インターフェロン イブリフラボン シクロスボリン アロプリノール		テオフィリン血中濃 度の上昇によると考 えられる。
ザフィルルカスト	テオフィリンの中毒 症状があらわれるこ とがある(「過量投 与」の項参照)。 副作用の発現に注意 し、異常が認められ た場合には減量又は 投与を中止するなど 適切な処置を行うこ と。 また、ザフィルルカ ストの血中濃度を低 下させることがある。	肝薬物代謝酵素が阻 害され、テオフィリ ンクリアランスが低 下するため、テオ フィリン血中濃度が 上昇すると考えられ る。 ザフィルルカストの 血中濃度低下につ いての機序は不明で ある。
リファンピシン フェノバルビタール ランソプラゾール リトナビル	テオフィリンの効果 が減弱することがあ る。 テオフィリン血中濃 度が低下することが あるので、適切な処 置を行うこと。	肝薬物代謝酵素の誘 導によりテオフィリ ンクリアランスが上 昇するため、テオ フィリン血中濃度が 低下すると考えられ る。

薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェニトイン カルバマゼピン	テオフィリン及び相 手薬の効果が減弱す ることがある。 テオフィリン血中濃 度が低下することが あるので、適切な処 置を行うこと。 また、相手薬の効果 減弱や血中濃度の低 下に注意すること。	肝薬物代謝酵素の誘 導によりテオフィリ ンクリアランスが上 昇するため、テオ フィリン血中濃度が 低下すると考えられ る。
ジピリダモール	ジピリダモールの作 用を減弱させること がある。	アデノシン拮抗作用 による。
ラマトロバン	ラマトロバンの血中 濃度が上昇すること がある。	ラマトロバンの血中 濃度上昇についての 機序は不明である。
リルゾール	リルゾールの作用を 増強(副作用発現) するおそれがある。	<i>in vitro</i> 試験でリル ゾールの代謝を阻害 することが示唆され ている。
タバコ	禁煙(禁煙補助剤で あるニコチン製剤使 用時を含む)により テオフィリンの中毒 症状があらわれるこ とがある(「過量投 与」の項参照)。 副作用の発現に注意 し、異常が認められ た場合には減量又は 投与を中止するなど 適切な処置を行うこ と。	喫煙により肝薬物代 謝酵素が誘導され、 テオフィリンクリア ランスが上昇し、テ オフィリン血中濃度 が低下すると考えら れる。また、禁煙に より血中濃度が上昇 すると考えられる。
セイヨウオトギリソ ウ(St. John's Wort、 セント・ジョーンズ・ ワート)含有食品	本剤の代謝が促進さ れ血中濃度が低下す るおそれがあるので、 本剤投与時はセイヨ ウオトギリソウ含有 食品を摂取しないよ う注意すること。	セイヨウオトギリソ ウにより誘導された 肝薬物代謝酵素が本 剤の代謝を促進し、 クリアランスを上昇 させるためと考えら れている。

#### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1) 重大な副作用(頻度不明)

- 1) ショック、アナフィラキシーショック：ショック、アナフィラキシーショック(蕁麻疹、蒼白、発汗、血圧低下、呼吸困難等)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 痙攣、意識障害：痙攣又はせん妄、昏睡等の意識障害があらわれることがあるので、抗痙攣剤の投与等適切な処置を行うこと。
- 3) 急性脳症：痙攣、意識障害等に引き続き急性脳症に至ることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、抗痙攣剤の投与等適切な処置を行うこと。
- 4) 横紋筋融解症：横紋筋融解症があらわれることがあるので、脱力感、筋肉痛、CK(CPK)上昇等に注意し、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うとともに横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
- 5) 消化管出血：潰瘍等による消化管出血(吐血、下血等)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) 赤芽球癆：赤芽球癆があらわれることがあるので、貧血があらわれた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 7) 肝機能障害、黄疸：肝機能障害(AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等)、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 8) 頻呼吸、高血糖症：頻呼吸、高血糖症があらわれることがある。

\*



## (2) その他の副作用

	頻 度 不 明
過敏症	発疹、癢痒感、蕁麻疹、紅斑（多形滲出性紅斑等）、固定薬疹
精神神経系	頭痛、不眠、神経過敏（興奮、不機嫌、いらいら感）、不安、めまい、耳鳴、振戦、しびれ、不随意運動、筋緊張亢進
循環器	顔面潮紅、動悸、頻脈、顔面蒼白、不整脈（心室性期外収縮等）
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、腹部膨満感、消化不良（胸やけ等）、しゃっくり
泌尿器	蛋白尿、頻尿
代謝異常	血清尿酸値、CK(CPK)の上昇等
肝 臓	AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、 $\gamma$ -GTPの上昇等
血 液	貧血、好酸球増多
その他	むくみ、倦怠感、関節痛、四肢痛、発汗、胸痛、低カリウム血症、鼻出血、しびれ（口、舌周囲）

## 5. 高齢者への投与

高齢者では副作用の発現に注意し、慎重に投与すること。  
[高齢者では、非高齢者に比べ最高血中濃度の上昇及びAUCの増加が認められたとの報告がある。]

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[動物実験（マウス、ラット、ウサギ）で催奇形作用等の生殖毒性が報告されている。また、ヒトで胎盤を通過して胎児に移行し、新生児に嘔吐、神経過敏等の症状があらわれることがある。]
- (2) 本剤投与中は授乳を避けさせること。[ヒト母乳中に移行し、乳児に神経過敏を起こすことがある。]

## 7. 小児等への投与

小児には慎重に投与すること（「慎重投与」の項参照）。

## 8. 過量投与

### (1) 症状

テオフィリン血中濃度が高値になると、血中濃度の上昇に伴い、消化器症状（特に悪心、嘔吐）や精神神経症状（頭痛、不眠、不安、興奮、痙攣、せん妄、意識障害、昏睡等）、心・血管症状（頻脈、心室頻拍、心房細動、血圧低下等）、低カリウム血症その他の電解質異常、呼吸促進、横紋筋融解症等の中毒症状が発現しやすくなる。なお、軽微な症状から順次発現することなしに重篤な症状が発現することがある。

### (2) 処置

過量投与時の処置には、テオフィリンの除去、出現している中毒症状に対する対症療法がある。血中テオフィリンの除去として輸液による排泄促進、活性炭の経口投与、活性炭を吸着剤とした血液灌流、血液透析等がある。なお、テオフィリン血中濃度が低下しても、組織に分布したテオフィリンにより血中濃度が再度上昇することがある。

#### 1) 痙攣、不整脈の発現がない場合

① 投与を中止し、テオフィリン血中濃度をモニターする。

② 痙攣の発現が予測されるようなら、フェノバルビタール等の投与を考慮する。ただし、フェノバルビタールは呼吸抑制作用を示すことがあるので、使用に際しては注意すること。

#### 2) 痙攣の発現がある場合

- ① 気道確保する。
- ② 酸素を供給する。
- ③ 痙攣治療のためにジアゼパム静注等を行う。痙攣がおさまらない場合には全身麻酔薬投与を考慮する。
- ④ バイタルサインをモニターする。血圧の維持及び十分な水分補給を行う。

#### 3) 痙攣後に昏睡が残った場合

- ① 気道確保し、酸素吸入を行う。
- ② テオフィリン血中濃度が低下するまでICU管理を継続し、十分な水分補給を続ける。血中濃度が下がらない場合には、活性炭による血液灌流、血液透析も考慮する。

#### 4) 不整脈の発現がある場合

- ① 不整脈治療としてペーシング、直流除細動、抗不整脈薬の投与等適切な処置を行う。

② バイタルサインをモニターする。血圧の維持及び十分な水分補給を行う。また、電解質異常がある場合はその補正を行う。

## 9. 適用上の注意

- (1) **調製・投与時**：本剤をブドウ糖及び果糖液で希釈した場合、経時的に添加物のエチレンジアミンと糖含量が低下し、黄変を認める可能性があるため、調製後は速やかに使用すること。
- (2) **投与速度**：本剤を急速に静脈内注射すると、上記副作用（ショック、不整脈等）や過呼吸、熱感があらわれることがあるので、生理食塩液又は糖液に希釈して、ゆっくり注射すること。
- (3) **輸液容器・輸液セット（ポリカーボネート製）の使用時**：本剤はエチレンジアミンを含有しており、本剤を10倍未満で希釈して使用した場合はポリカーボネート製の三方活栓のコネクター部にひび割れが生じ、液漏れ等が発生する可能性がある。また、過度な締め付けが、破損の発生を助長する要因となるので注意すること。
- (4) **アンプルカット時**：本剤はワンポイントアンプルであるが、アンプルカット部分をエタノール綿等で清拭し、カットすることが望ましい。

## \*【薬効薬理】<sup>1)</sup>

アミノフィリン水和物はテオフィリンとエチレンジアミンの結合体で、溶解性を高めたものである。キサンチン誘導体に共通の作用を示す。すなわち、ホスホジエステラーゼ阻害による細胞内サイクリックAMPの増加、アデノシン受容体遮断、細胞内貯蔵Ca<sup>2+</sup>の遊離促進などである。これらが総合して、骨格筋興奮、心筋興奮（心拍数と収縮力の増加）、平滑筋弛緩などの作用を示す。


## 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：アミノフィリン水和物（Aminophylline Hydrate）

化学名：1, 3-Dimethyl-1H-purine-2, 6(3H, 7H)-dione hemi(ethylenediamine) hydrate

分子式：(C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> · C<sub>2</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub> · xH<sub>2</sub>O

構造式：



性状：本品は白色～微黄色の粒又は粉末で、においはないか、又はわずかにアンモニアようのにおいがあり、味は苦い。水にやや溶けやすく、メタノールに溶けにくく、エタノール（95）又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。  
本品1gに水5mLを加えて振り混ぜるとき、ほとんど溶け、2～3分後、結晶が析出し始める。この結晶は少量のエチレンジアミンを追加するとき溶ける。  
本品は光によって徐々に変化し、空气中に放置するとき、次第にエチレンジアミンを失う。

## 【取扱い上の注意】

### 1. 取扱い上の注意

本剤は緩衝性が強く、他剤を本剤のpH域に近づける性質がある。したがって、アルカリ性で不安定な薬剤や酸性の薬剤等とは変化を生ずる場合があるので配合には注意すること。

### \*\* 2. 安定性試験<sup>2)</sup>

アミノフィリン静注250mg「日新」は、最終包装製品を用いた長期保存試験（遮光保存、3年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、遮光保存における3年間の安定性が確認された。

### \*\*【包装】

アミノフィリン静注250mg「日新」（10mL） 50管

## 【主要文献】

- \*1) 第十六改正日本薬局方解説書、C-260、廣川書店（2011）
- \*2) 日新製薬株式会社 社内資料：安定性に関する資料

## 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

- \* 日新製薬株式会社 安全管理部  
〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号  
TEL 023-655-2131 FAX 023-655-3419  
E-mail : d-info@yg-nissin.co.jp

---

製造販売元



**日新製薬株式会社**

山形県天童市清池東二丁目3番1号