

クロピドグレル錠「日新」を 服用される患者さんへお渡してください。

《先生方へのお願い》

クロピドグレル錠「日新」を服用されている患者さんが転院される際には、本用紙に**クロピドグレル錠「日新」の1日の服用量等**を必ず記載して、転院先の医師にお見せいただくよう、患者さんへご指導をお願いします。

クロピドグレル錠「日新」

を服用される患者さんへ

<input type="checkbox"/> 錠25mg			
<input type="checkbox"/> 錠75mg			

診療を受ける病院・医院が変更になった際は、このカードを医師にお見せください。

●お名前：

●服用量：

クロピドグレル錠25mg「日新」(錠/日)

クロピドグレル錠75mg「日新」(錠/日)

●服用開始日： 年 月 日

●病・医院名：

TEL ()

この薬は、血栓（血のかたまり）の形成を抑え、血管がつまるのを防ぎます。医師・薬剤師の指示を守って、飲んでください。

◆この薬を飲んで、普段と違う以下のような症状がみられたら、すぐに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- ・皮膚が黄色くなる
- ・鼻や歯ぐきからの出血がある
- ・皮膚にあざや、ぶつぶつ、みずぶくれができる
- ・尿の色が濃く（褐色）なったり、血が混じったりする
- ・白眼が黄色くなる
- ・かぜのような症状が出る（発熱、さむけ、のどの痛み）
- ・気分が悪い
- ・強い疲労感、食欲低下がある
- ・うとうとする、意識が低下する

◆他の病院・診療科を受診する際（特に手術や歯の治療を受ける際）は、この薬を飲んでいることを医師に伝えてください。

- ・1日1回飲んでください。（空腹時は避けることが望ましい。）
- ・飲み忘れた場合、決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・この薬は、直射日光、湿気を避け、また、他の方が誤って飲んでしまうことがないように、注意して保管してください。
- ・薬が残った場合は、保管しないで全て廃棄してください。

ご連絡先：