クロピドグレル錠「日新」を服用される患者さんへお渡しください。

≪先生方へのお願い≫

クロピドグレル錠「日新」を服用されている患者さんが転院される際には、本用紙に**クロピドグレル錠「日新」の1日の服用量等**を必ず記載して、転院先の医師にお見せいただくよう、患者さんへご指導をお願いします。

クロピドグレル錠「日新」
を服用される患者さんへ

□ 錠25mg	
□ 錠75mg	

診療を受ける病院・医院が変更になった際は、
このカードを医師にお見せください。

●お名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●服用量：

□ クロピドグレル錠25mg「日新」(　　錠/日)

□ クロピドグレル錠75mg「日新」(　　錠/日)

●服用開始日：　　年　　月　　日

●病・医院名：

TEL　　(　　)

〈裏面も必ずお読みください〉

このお薬は、血栓（血のかたまり）の形成を抑え、血管がつまるのを防ぎます。医師・薬剤師の指示を守って、飲んでください。

◆このお薬を飲んで、普段と違う以下のような症状がみられたら、すぐに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- **皮膚が黄色くなる**
- **皮膚にあざや、ぶつぶつ、みずぶくれができる**
- **白眼が黄色くなる**
- **気分が悪い**
- **強い疲労感、食欲低下がある**
- **皮膚の広い範囲が赤くなる**
- **くちびるがただれる**
- **うとうとする、意識が低下する**
- **鼻や歯ぐきからの出血がある**
- **便が黒くなる**
- **かぜのような症状が出る（発熱、さむけ、のどの痛み）**
- **眼が充血する**

◆他の病院・診療科を受診する際（特に手術や歯の治療を受ける際）は、このお薬を飲んでいることを医師に伝えてください。

- 1日1回飲んでください。（空腹時は避けることが望ましい。）
- 飲み忘れた場合、決して2回分を一度に飲まないでください。
- このお薬は、直射日光、湿気を避け、また、他の方が誤って飲んでしまうことがないよう、注意して保管してください。
- お薬が残った場合は、保管しないで全て廃棄してください。

ご連絡先：

2020年5月改訂　B