

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年9月

製造販売元



日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠

ピタバスタチンCa錠1mg「日新」

ピタバスタチンCa錠2mg「日新」

ピタバスタチンCa錠4mg「日新」

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（ ____部：追記）

改訂後	改訂前												
【使用上の注意】 4. 副作用 (2) その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注1)}</td><td>発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫</td></tr><tr><td colspan="2">(略)</td></tr></tbody></table> 注1) このような場合には投与を中止すること。		頻度不明	過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫	(略)		【使用上の注意】 4. 副作用 (2) その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症^{注1)}</td><td>発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑</td></tr><tr><td colspan="2">(略)</td></tr></tbody></table> 注1) このような場合には投与を中止すること。		頻度不明	過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑	(略)	
	頻度不明												
過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑、血管性浮腫												
(略)													
	頻度不明												
過敏症 ^{注1)}	発疹、そう痒、蕁麻疹、紅斑												
(略)													

改訂理由

- ◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報 (DSU No.292 2020年9月) に掲載される予定です。
最新の医薬品添付文書情報は、PMDA HP「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
および弊社HP (<https://www.yg-nissin.co.jp/>) に掲載致します。