

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2022年8月

製造販売元  **日新製薬株式会社**  
山形県天童市清池東二丁目3番1号

### HMG-CoA 還元酵素阻害剤

日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

**ロスバスタチン錠2.5mg「日新」**

**ロスバスタチン錠5mg「日新」**

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。  
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

#### 改訂内容（ 部：追記）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
3. 相互作用			3. 相互作用		
現行のとおり			省略		
(2) 併用注意（併用に注意すること）			(2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)			(略)		
バダデュスタット	現行のとおり	現行のとおり	バダデュスタット	省略	省略
フェブキソスタット	本剤とフェブキソスタットを併用したとき、本剤のAUCが約1.9倍、C <sub>max</sub> が約2.1倍上昇したとの報告がある。	フェブキソスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。	エルトロンボパグ	省略	省略
エルトロンボパグ	現行のとおり	現行のとおり			

#### 改訂理由

◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU No.311 2022年9月）に掲載される予定です。  
最新の電子添文は、PMDA HP「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）  
および弊社HP（<https://www.yg-nissin.co.jp/>）に掲載致します。