

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2021年2月

製造販売元

 **日新製薬株式会社**

山形県天童市清池東二丁目3番1号

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

ロスバスタチン錠2.5mg「日新」

ロスバスタチン錠5mg「日新」

ロスバスタチンカルシウム製剤

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（ 部：追記）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 現行のとおり (2) 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 3. 相互作用 省略 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略)					
カプマチニブ塩酸塩水和物	本剤とカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、本剤のAUCが約2.1倍、Cmaxが約3.0倍上昇したとの報告がある。	カプマチニブ塩酸塩がBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。	エルトロンボパグ	省略	省略
バダデュスタット	本剤とバダデュスタットを併用したとき、本剤のAUCが約2.5倍、Cmaxが約2.7倍上昇したとの報告がある。	バダデュスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。			
エルトロンボパグ	現行のとおり	現行のとおり			

改訂理由

- ◆自主改訂

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行「医薬品安全対策情報（DSU No.297 2021年3月）」に掲載される予定です。
最新の医薬品添付文書情報は、PMDA HP「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）
および弊社HP（<https://www.yg-nissin.co.jp/>）に掲載致します。