ミルタザピン錠「日新」を服用される患者さんとご家族の方へ

15mg

30mg

このお薬は、脳内の神経伝達をスムーズにし、抑うつ気分や不安を和らげます。

お薬を飲む前に

７～17歳の大うつ病性障害のある人がこのお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。**18歳未満の大うつ病性障害のある人は、主治医と十分に相談してください。**

お薬の飲み方

- 主治医に指示された用量を守ってください。飲み忘れた場合は、気がついた時に、できるだけ早く１回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は１回とばして、次の時間に１回分を飲んでください。決して２回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は、胸がドキドキする、自分のいる場所や時間、自分や人の名前などがわからなくなる、静かになるなどの症状があらわれる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。
- このお薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいら、あせりなどの症状があらわれることがあります。主治医の指示どおりに飲み続けることが重要です。

＜裏面も必ずお読みください＞

お薬を服用中の注意

- うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。このお薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがありますので、このような症状があらわれた場合には、主治医に相談してください。
- 不安になる、いらいらする、あせる、興奮しやすい、発作的にパニック状態になる、ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、敵意を持つ、攻撃的になる、衝動的に行動する、じっとしていることができない、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、主治医に相談してください。このお薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。
- 眠気、めまいなどの症状があらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- お薬の効果に影響しますので、飲酒は控えてください。
- 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

ご家族の方へ

ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化やうつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する危険性について主治医から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、主治医に連絡してください。また、患者さんご自身も病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先：

日新製薬株式会社　　2018年12月作成　A