リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」・リドカイン塩酸塩注 1%「日新」・リドカイン塩酸塩注 2%「日新」の報告副作用に関する資料

日 新 製 薬 株 式 会 社
安 全 管 理 部

リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」・リドカイン塩酸塩注 1%「日新」・リドカイン塩酸塩注 2%「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始　0.5%パートラン注 PB・1%パートラン注 PB・2%パートラン注 PB：2004 年７月
⇒リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」・リドカイン塩酸塩注 1%「日新」・リドカイン塩酸塩注 2%「日新」：2014 年６月（販売名変更）

2024 年２月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2016 年	男性	74 歳	頸椎骨軟化症	リドカイン塩酸塩注 0.5%「日新」	ショック	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	不明
2019 年	男性	52 歳	左尿管結石、左水腎症（検査時の仙骨硬膜外麻酔）	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	めまい、嘔気	不明	回復
2020 年	男性	75 歳	不明	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	アナフィラキシーショック	アルプロスタジル、イオヘキソール	不明
2021 年	女性	35 歳	花粉症（手術時の局所麻酔、硬膜外麻酔）	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	アレルギー反応（頻脈、血圧低下）	ブピバカイン塩酸塩水和物	回復
2021 年	男性	56 歳	不明	リドカイン塩酸塩注 1%「日新」	アナフィラキシーショック	イオパミドール	不明
2022 年	男性	不明	（検査時に使用）	リドカイン塩酸塩注「日新」（規格不明）	アレルギー（徐脈）	不明	回復

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2022 年	女性	49 歳	不明	リドカイン塩酸塩注 2%「日新」	馬尾症候群	ロピバカイン塩酸塩水和物、レボブピバカイン塩酸塩	不明

以上