

# メマニチコ塩酸塩OD錠「日新」を服用される患者さん及びご家族、介護者の方へ

このお薬は、認知症症状の進行を遅らせるために使用します。

○ 5mg



○ 10mg



○ 15mg



○ 20mg



- お薬の飲み始めの時期にめまいや眠気などがあらわれることがありますので、このような症状があらわれた場合には、主治医に相談してください。また、このような症状により転倒することなどがありますので、注意してください。

<裏面も必ずお読みください>

# ● ● 飲み方と気をつけていただきたいこと ● ●

- 主治医、薬剤師の指示を守って、**1日1回**飲んでください。
- 水なしで、舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液と一緒に飲むこともできます。寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- 体をこのお薬に慣らすために、1週間ごとにお薬の量が増えていきます。

通常、5mg錠から開始し、1週間ごとに5mgずつ増え、4週目以降は20mg錠になります。腎臓に高度の障害のある患者さんは1日1回10mg錠までです。



- 飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分ができるだけ早く飲んでください。**決して2日分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く飲んだ場合は、直ちに主治医または薬剤師に相談してください。
- 主治医の指示なしに、お薬を飲むのをやめないでください。
- 飲む回数や量を間違わないように、お薬はできるだけご家族や介護者が管理してください。
- 子どもの手の届かないところで、湿気を避けて保管してください。

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先 :