

# ★ エソゾピクロン錠「日新」 を服用される患者さんへ ★

□ 錠1mg



(白色)

□ 錠2mg



(淡黄色)

□ 錠3mg



(淡赤色)

このお薬は、不眠症の治療に使われます。  
服用するときは、下記の注意事項をお守りください。

- 必ず主治医または薬剤師の指示どおりに飲んでください。
- 寝る直前、寝るしたくをすべて済ませてから飲んでください。
- いったん寝たあと、短時間後にまた起きて、仕事などをやる可能性があるときは、飲まないでください。
- 食事と同時、または食後2時間は飲まないでください。
- 主治医の指示なしに、ご自分の判断でお薬を飲むのをやめたり、飲む量を変えたりしないでください。

- お薬の影響が次の朝以降にみられたり、眠気、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- アルコール(飲酒)はこのお薬に影響しますので、控えてください。

**このお薬を飲んでいる間、副作用として、味覚異常(お薬の成分による苦み)があらわれることがあります。**

味覚異常(お薬の成分による苦み)は、お薬を飲んだ後、しばらくしてからあらわれることもあります。

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先：