

# 先発品と効能又は効果、用法及び用量が異なる製品

日新製薬株式会社

■フェブキソスタット錠10mg・20mg・40mg「日新」【薬価基準未収載】

■フェブキソスタットOD錠10mg・20mg・40mg「日新」【薬価基準未収載】

一般名：フェブキソスタット 規格：フェブキソスタットとして10mg/1錠・20mg/1錠・40mg/1錠

下線部：相違点

	自社品（通常錠・OD錠共通）	先発品（フェブリク錠 10mg・20mg・40mg）
効能又は効果	痛風、高尿酸血症	○痛風、高尿酸血症 ○がん化学療法に伴う高尿酸血症
用法及び用量	通常、成人にはフェブキソスタットとして1日10mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回40mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回60mgとする。	<b>&lt;痛風、高尿酸血症&gt;</b> 通常、成人にはフェブキソスタットとして1日10mgより開始し、1日1回経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1日1回40mgで、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日1回60mgとする。 <b>&lt;がん化学療法に伴う高尿酸血症&gt;</b> <u>通常、成人にはフェブキソスタットとして60mgを1日1回経口投与する。</u>

2022年2月