

痛風・高尿酸血症で

フェブキソスタット錠「日新」 フェブキソスタットOD錠「日新」 を服用される患者さんへ

このお薬は、体内で尿酸を作る酵素の働きを抑え、血液中の尿酸の量を低下させます。

このお薬の飲み始めに痛風発作が起こることがありますが、そのままお薬を飲み続けてください。

血液中の尿酸の濃度が急激に下がると、関節などに沈着していた尿酸の結晶が一気に溶け始め、それがきっかけで痛風発作が起こることがあります。痛風発作が起きた時に尿酸値を下げるお薬を急に止めると、かえって発作がひどくなる場合がありますので、主治医から指示されたとおりに、お薬を飲み続けてください。痛風発作の治療については、あらかじめ指示された痛み止めなどがある場合は、併せてお飲みください。

<裏面も必ずお読みください>

お薬の服用中は次のことに注意してください。

- ▼このお薬は、尿酸値をゆっくり下げするために、少ない量から開始し、目標の尿酸値に下がるまで少しずつ飲む量を増やしていきます。自分の判断で飲むのを止めたり、飲む量を変えたりすると、症状の悪化や再発につながりますので、主治医から指示されたとおりにお飲みください。

高尿酸血症や痛風の治療は、継続することが大切です。定期的に診察を受けながら、一步一步着実に治療に取り組みましょう。

- ▼飲み忘れた場合は、できるだけ早くお飲みください。ただし、次の飲む時間が近い場合には、次の飲む時間まで待ってお飲みください。その場合、2回分を一度に飲まないでください。



次のような症状が急にあらわれた場合には、主治医または薬剤師に相談してください。

- 全身がだるい
- 動悸
- 食欲がない
- 多汗
- 皮膚や白目が黄色くなる
- 下痢
- 全身の皮疹や発疹
- 便秘

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。