

メピバカイン塩酸塩注 0.5%「日新」・メピバカイン塩酸塩注 1%「日新」・ メピバカイン塩酸塩注 2%「日新」の報告副作用に関する資料

日新製薬株式会社
安全管理部

メピバカイン塩酸塩注 0.5%「日新」・メピバカイン塩酸塩注 1%「日新」・メピバカイン塩酸塩注 2%「日新」の報告副作用につきましては下記の通りです。
医薬品の適正使用の資料としてご利用下さい。

販売開始 0.5%塩酸メピバカイン注 PB：2003年10月
⇒メピバカイン塩酸塩注 0.5%「日新」：2024年1月（販売名変更）

1%塩酸メピバカイン注 PB：2003年10月
⇒メピバカイン塩酸塩注 1%「日新」：2024年2月（販売名変更）

2%塩酸メピバカイン注 PB：2003年10月
⇒メピバカイン塩酸塩注 2%「日新」：2024年4月（販売名変更）

2024年4月末現在

情報入手	性別	年齢	原疾患等	被疑薬	副作用内容	併用被疑薬	転帰
2019年	男性	78歳	腰椎椎間板ヘルニア、 2型糖尿病、安定狭心症、 下垂体前葉機能低下症	塩酸メピバカイン注 PB (規格不明)	吐き気、倦怠感	なし	軽快
2020年	女性	33歳	不明	1%塩酸メピバカイン注 PB	馬尾症候群	ロピバカイン塩酸塩水和物	不明
2021年	男性	64歳	疼痛、頭痛	1%塩酸メピバカイン注 PB	呼吸困難、心停止	【併用薬（被疑薬かは不明）】 ベタメタゾンリン酸エステル ナトリウム	不明

以上